

TRAUMATISME CRANEOENCEFÀLIC

TRACTAMENT

Durant les hores i dies posteriors a patir un TCE, independentment de la seva intensitat, s'ha de controlar-ne els símptomes i parar atenció a la evolució de la persona afectada. En els casos més lleus en els que no queden seqüeles pot tractar-se amb medicaments analgèsics i antiinflamatoris.

En molts casos no és així i els TCE tenen seqüeles. Es poden veure afectades diverses zones del cervell i en alguns casos caldrà rehabilitació per tal de poder millorar la situació i, dins del possible, poder tornar a la normalitat. Un TCE pot causar lesions greus irreversibles, és per aquest motiu que moltes persones necessitaràn atenció continuada de per vida per a poder seguir endavant. En aquests casos és important que les persones cuidadores tinguin el coneixement suficient per a poder ajudar a l'usuari a seguir amb la seva vida de la manera més normativa possible.

AVAN AL TEU COSTAT!

- Informació i assessorament sobre recursos
- Formació per a cuidadors no professionals i informació
- Suport psicològic individual i grupal
- Servei de rehabilitació i manteniment
- Programes de lleure, socialització i inserció en el món social i laboral.

QUÈ ÉS?

Un TCE és un dany cerebral adquirit generalment provocat per un impacte violent al cap. Aquest impacte pot provocar lesions que afectin al cervell i a les habilitats cognitives i motores de la persona que l'ha patit.

SÍMPTOMES

La simptomatologia dependrà de la intensitat de les lesions i poden aparèixer immediatament o transcorreguts uns dies de l'accident. Els més comuns són:

- Pèrdua del coneixement
- Desorientació o confusió
- Mal de cap o mareig
- Nàusees o vòmits
- Fatiga o somnolència
- Alteració en la parla
- Alteració de la son
- Pèrdua d'equilibri
- Alteracions sensorials
- Problemes de memòria
- Alteracions anormals en l'estat d'ànim

